



Natur-Apotheke



Stand: März 2017

*In der Tradition
verwurzelt, mit Blick
in die Zukunft.*

Wir bieten als Familienunternehmen bewährte Präparate bei:

- Erkältung / Keuchhusten / Asthma
- Verdauungsstörungen
- Nervosität
- Erschöpfung
- Leber-Galle / Milz
- Rheuma / Gicht / Arthrose
- Kopfschmerzen
- Nervenschmerzen
- Haut pflegen und heilen
- Regelschmerzen
- Bauchschmerzen
- Abnehmen / Gewicht halten
- Haut pflegen und heilen
- Allergien / Heuschnupfen
- Krampfadern / Venen
- Herz-Kreislauf / Altersherz / Blutdruck
- Schilddrüsenüberfunktion
- Schilddrüsenunterfunktion

Das Familienunternehmen

Wir als Familienunternehmen stehen Ihnen gerne zur Seite, soweit uns dies im Rahmen der Gesetzgebung möglich ist: gesundheitsbezogene Anfragen dürfen wir Ihnen als Hersteller nicht beantworten, da der Gesetzgeber dafür die individuelle Beratung durch Ärzte, Apotheker und Heilpraktiker vorschreibt. Sie erhalten von uns jedoch stets aktuelle Angebote und die Bezugsquellen für unsere Arzneimittel und auf Wunsch auch Hinweise zu naturheilkundlich ausgerichteten Apotheken.

Für Sie als unser Kunde gilt: Wir nehmen uns Zeit für SIE, es gibt keine Warteschleife, auch nicht am Telefon!

Unsere Preisgestaltung orientiert sich an der Tatsache, dass Sie die Präparate selbst bezahlen müssen. Deshalb haben wir schon immer auf Werbung in Form von teuren Anzeigen oder Werbegeschenken an Ärzte, Apotheken und Heilpraktiker verzichtet, die inzwischen sogar vom Gesetzgeber verboten wurden!

Der Gesetzgeber schreibt vor, welche Präparate freiverkäuflich sind und welche nur über Apotheken zu beziehen sind. Generell sind alle Presselin Präparate in jeder Apotheke verfügbar. Gelegentlich werden sie nicht vorrätig sein, können aber innerhalb von Stunden durch die Apotheke beim pharmazeutischen Großhandel bestellt werden. Ein Preisvergleich lohnt sich immer, da jede Apotheke unterschiedliche Preise anbietet.

Nicht apothekenpflichtige Produkte, wie z. B. Nahrungsergänzungsmittel und traditionelle pflanzliche Arzneimittel, können Sie bei uns direkt bestellen.

Bleiben noch Wünsche offen?
Wir sind für Sie da und freuen uns auf Sie!



Bild: Unser „Hausberg“ Bussen

COMBUSTIN
Pharmaz. Präparat GmbH
Offinger Straße 7
D-88525 Hailingen

Service (0 73 71) 966 700
Tel. (0 73 71) 96 53 56
Fax. (0 73 71) 96 53 58

info@combustin.de
www.presselin.de

04|05

„Adsella Energie beinhaltet Eisen, Magnesium, Vitamin B1, B2, B6, B12 und C und trägt damit zu einem normalen Energiestoffwechsel bei.“



Presselin Adsella Energie

Presslinge mit den Vitaminen A, B1, B2, B6, B12, C sowie Magnesium und den Spurenelementen Eisen, Selen und Zink.

Durch Vitamin B1, B2, B6, B12, C und Magnesium wird eine normale Funktion des Nervensystems unterstützt.

Das Immunsystem wird in seiner normalen Funktion unterstützt durch Zink, Eisen, Selen und die Vitamine A, B6, B12 und C. Vitamin C trägt zusätzlich zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei und hilft die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Eisen, Magnesium und die Vitamine B2, B6, B12 und C tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Zutaten:

Füllstoff Cellulose, Extrakt von grünen **Haferspitzen**, Magnesiumoxid, Bärlauchkraut, Mateblätter, Kolanuss, Kaliumchlorid, **Soyalecithin**, Rosmarin, Melisseblätter, Vitamin C, Trennmittel Siliciumdioxid, Eisengluconat, Eisenkraut, Emulgator Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Zinkcitrat, Vitamin A, L-Selenmethionin, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B12.

Verzehrempfehlung:


Für Ihr Wohlbefinden empfehlen wir 3 mal täglich 1 Pressling mit etwas Wasser oder Fruchtsaft einzunehmen.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrmenge (3 Presslinge)	%-Satz der Referenzmenge*
Thiamin (Vitamin B1)	1,6 mg	146 %
Riboflavin (Vitamin B2)	1,8 mg	130 %
Vitamin B6	2,1 mg	149%
Vitamin B12	9,0 µg	360 %
Vitamin A	815 µg	102 %
Vitamin C	77 mg	96 %
Magnesium	149 mg	40 %

	Pro Tagesverzehrmenge (3 Presslinge)	%-Satz der Referenzmenge*
Selen	14,5 µg	26 %
Zink	5,2 mg	52 %
Eisen	4,6 mg	33 %

*nach Lebensmittel-Informationsverordnung



Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 100 Presslingen,
Netto-Gewicht: 82g,
PZN - 02945791

Mehr Informationen:



A photograph of a paved road stretching into the distance, flanked by trees with vibrant red and orange autumn leaves. The sky is bright and overexposed.

06|07

„Presselin Artkomplex
enthält Kalium und die
Vitamine B1 und E.“

Presselin Artkomplex

Presslinge mit Kalium und den Vitaminen Thiamin (B1) und E.

Thiamin (Vitamin B1) trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel, einer normalen Funktion des Nervensystems, zu einer normalen psychischen Funktion und zu einer normalen Herzfunktion bei.

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Kalium trägt zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zu einer normalen Muskelfunktion bei.

Außerdem trägt Kalium zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutdrucks bei.

Zutaten:

Füllstoff Cellulose, Bärlauchkraut, Johannisbrotfrüchte, Rosmarin, Knoblauchpulver, Weinblätter, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), getrockneter Süßholzsaft, Vitamin E, Vitamin B1 (Thiamin), Kalium.

Verzehrempfehlung:

Für Ihr Wohlbefinden empfehlen wir 3 mal täglich 2 Presslinge mit etwas Wasser einzunehmen.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrmenge (6 Presslinge)	Prozentsatz der Referenzmenge*
Kalium	300 mg	15 %
Thiamin (Vitamin B1)	4,8 mg	100 %
Vitamin E	12 mg	100%

*nach Lebensmittel-Informationsverordnung

NEUE
REZEPTUR:
JETZT MIT
KALIUM!

Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 100 Presslingen,
Netto-Gewicht: 67g,
PZN – 12734173

Mehr Informationen:



A photograph of a man with dark hair and a beard, smiling and wearing a straw hat, lying in a field of tall green grass. He is wearing a white long-sleeved shirt. The background is filled with bright green grass.

08 | 09

„Niacin trägt zur
Verringerung von
Müdigkeit und Ermüdung
bei“

Presselin Auszeit

Nahrungsergänzungsmittel mit Niacin (Vitamin B3).

Niacin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und einer normalen Funktion des Nervensystems bei.
Zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung.

Außerdem trägt Niacin zur normalen psychischen Funktion und zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei.

Zusätzlich hilft Niacin bei der Erhaltung normaler Haut.

Zutaten:

Füllstoff Cellulose, Sibirische Ginsengwurzel, Passionsblumenkraut, Rosenwurzwurzel-Extrakt, Baldrian-Extrakt, Mutterkraut, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Nicotinamid

Verzehrempfehlung:

Für Ihr Wohlbefinden empfehlen wir 3 mal täglich 1 Pressling zerkaut oder unzerkaut mit etwas Wasser oder Fruchtsaft einzunehmen.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrmenge (3 Presslinge)	Prozentsatz der Referenzmenge*
Niacin (Vitamin B3)	16 mg	100 %

*nach Lebensmittel-Informationsverordnung



Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 100 Presslingen,
Netto-Gewicht: 56g,
PZN - 09245045

Mehr Informationen:



Presselin Erholsame Nacht

Presselin Erholsame Nacht ist eine Kombination aus bewährten Kräuterauszügen.

Zutaten:

Enthält Auszüge von Baldrian, Hopfen, Lavendel, Melisse, Passionsfruchtsaftkonzentrat.

Hinweise:

Spirituose. 31,7 Vol.-% Alkohol. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Glasflasche inkl. Messbecher.
Flasche mit 200 ml
PZN - 09207760

Mehr Informationen:





Presselin Peptikum

Presselin Peptikum ist eine Kombination aus bewährten Kräuterauszügen.

Zutaten:

Enthält Auszüge von Fenchel, Ingwer, Kamille, Kardamom, Koriander, Kümmel, Lavendel, Salbei.

Hinweise:

Spirituose. Enthält 30,4 Vol.-% Alkohol. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Glasflasche inkl. Messbecher.
Flasche mit 200 ml
PZN - 09207808

[Mehr Informationen:](#)





12 | 13

Presselin Lebensfreude

Presslinge mit den Vitaminen Riboflavin (B2) und Pantothensäure, sowie Chrom und Cholin.

Riboflavin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Außerdem unterstützt Riboflavin den Erhalt von roten Blutkörperchen und trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei. Darüber hinaus hilft es, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen sowie Müdigkeit und Ermüdung zu verringern.

Pantothenäsäure unterstützt einen normalen Energiestoffwechsel und trägt zu einer normalen Synthese, einer normalen geistigen Leistung und zu einem normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern bei.

Chrom trägt zur Erhaltung eines normalen Stoffwechsels von Makronährstoffen bei. Chrom hilft außerdem bei der Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels.

Cholin trägt zu einem normalen Homocystein-Stoffwechsel, einem normalen Fettstoffwechsel und zur Aufrechterhaltung einer normalen Leberfunktion bei.

Zutaten:

Füllstoff Cellulose, Löwenzahnblätter, Kamillenblüten, Kurkumawurzel, schwarze Johannisbeere-Blätter, Erdbeerblätter, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Cholin, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B2, Chrom.

Verzehrempfehlung:

Für Ihr Wohlbefinden empfehlen wir 3 mal täglich 2 Presslinge mit etwas Wasser einzunehmen.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrsmenge (6 Presslinge)	Prozentsatz der Referenzmenge*
Riboflavin (Vitamin B2)	1,38 mg	100 %
Pantothenäsäure (Vitamin B5)	6,0 mg	100 %
Cholin	200 mg	50%
Chrom	40 µg	100 %

* nach Lebensmittel-Informationsverordnung

Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 100 Presslingen,
Netto-Gewicht: 65,4g,
PZN - 12734196

Mehr Informationen:



„Vitamin B2 und Niacin tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.“



Presselin Magda

Presslinge mit Niacin und Riboflavin (Vitamin B2).

Vitamin B2 und Niacin tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Außerdem tragen Vitamin B2 und Niacin zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Darüber hinaus trägt Niacin zur normalen psychischen Funktion und zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei.

Zusätzlich hilft Niacin bei der Erhaltung normaler Haut.

Riboflavin unterstützt den Erhalt von roten Blutkörperchen und trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei. Darüber hinaus hilft es, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen sowie Müdigkeit und Ermüdung zu verringern.

Zutaten:

Füllstoff Cellulose, Kamillenblüten, Kalmuswurzel, Fenchelsamen, Pfefferminze, Kümmelsamen, Melisse, Salbei, Trennmittel Siliciumdioxid, Nicotinamid, Wermutblätter, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Vitamin B2

Verzehrempfehlung:

Für Ihr Wohlbefinden empfehlen wir 3 mal täglich 2 Presslinge mit etwas Wasser einzunehmen.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrmenge (6 Presslinge)	Prozentsatz der Referenzmenge*
Riboflavin (Vitamin B 2)	5,4 mg	386 %
Niacin	60 mg	375 %

*nach Lebensmittel-Informationsverordnung



Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 100 Presslingen
= 65g,
PZN - 12734210

Mehr Informationen:





Presselin Meta

Presslinge mit den Vitaminen B2 und Pantothenäsäure (Vitamin B 5) .

Vitamin B2, auch unter dem Namen Riboflavin bekannt, trägt zu einem normalen Energie- und Eisenstoffwechsel und einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Vitamin B 2 hilft, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Pantothenäsäure (Vitamin B5) trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel, zu einer normalen Synthese und zu einem normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern bei. Außerdem trägt Pantothenäsäure zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung sowie zu einer normalen geistigen Leistung bei.

Zutaten:

Flohsamen, Füllstoff Cellulose, Hagebutten, Leinsamen, Fenchelsamen, getrockneter Süßholzsaft, Kamillenblüten, Trennmittel Siliciumdioxid, Wacholderbeeren, Baumwollsamenöl, Palmöl, Trennmittel Hydroxypropylcellulose, Trennmittel Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Calcium-D-pantothenat, Vitamin B2

Verzehrempfehlung:

Für Ihr Wohlbefinden empfehlen wir 3 mal täglich 2 Presslinge zerkaaut oder unzerkaut mit etwas Wasser oder Fruchtsaft einzunehmen.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrsmenge (6 Presslinge)	Prozentsatz der Referenzmenge*
Riboflavin (Vitamin B 2)	1,6 mg	100 %
Pantothenäsäure (Vitamin B 5)	6,0 mg	100 %

* nach Lebensmittel-Informationsverordnung

Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 100 Presslingen,
Netto-Gewicht: 85,5g,
PZN - 12734227

[Mehr Informationen:](#)



Presselin Niebla

Presslinge mit den Vitaminen B6 und C.

Vitamin B 6 trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel, einem normalen Eiweiß- und Glycogenstoffwechsel und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei.

Darüber hinaus hilft Vitamin B 6 dem Körper bei der Regulierung der Hormontätigkeit und trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Außerdem trägt Vitamin B6 zu einer normalen Cystein-Synthese, einem normalen Homocystein-Stoffwechsel, zur normalen Bildung roter Blutkörperchen und zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.

18|19

Vitamin C trägt ebenfalls zu einem normalen Energiestoffwechsel, einer normalen Funktion des Nervensystems und einer normalen Funktion des Immunsystems bei und erhöht die Eisenaufnahme. Außerdem unterstützt Vitamin C eine normale Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße, der Knochen, der Knorpel, des Zahnfleisches, der Haut und der Zähne. Zudem trägt Vitamin C zu einer normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei und hilft die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Darüber hinaus trägt Vitamin C zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Zutaten:

Füllstoff Cellulose, Petersilie, Dillfrüchte, Brennnesselblätter, Vitamin C, Lindenblüten, Wacholderbeeren, Liebstöckelwurzel, **Sellerie**blätter, **Sellerie**wurzel, Trennmittel (Siliciumdioxid, Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Vitamin B6

Verzehempfehlung:

Für Ihr Wohlbefinden empfehlen wir 3 mal täglich 2 Presslinge mit etwas Wasser einzunehmen.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrsmenge (6 Presslinge)	Prozentsatz der Referenzmenge*
Vitamin B 6	1,4 mg	100 %
Vitamin C	80,0 mg	100 %

*nach Lebensmittel-Informationsverordnung



Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 100 Presslingen,
Netto-Gewicht: 75g,
PZN - 12734204

Mehr Informationen:



Presselin Paticum

Presslinge mit den Vitaminen E und Pantothensäure (Vitamin B5).

Pantothensäure, ein Vitamin aus der B-Gruppe, trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel, zu einer normalen Synthese und zu einem normalen Stoffwechsel von Steroidhormonen, Vitamin D und einigen Neurotransmittern bei. Außerdem trägt Pantothensäure zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung sowie zu einer normalen geistigen Leistung bei.

Vitamin E trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Zutaten:

Füllstoff Cellulose, Rote Beete Saftpulver, Artischockenblätter, Palmöl, Löwenzahnblätter, Extrakt von Judendornbeeren, Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Siliciumdioxid), getrockneter Süßholzsaft, Vitamin E, Calcium-D-pantothenat.

Verzehrempfehlung:

Für Ihr Wohlbefinden empfehlen wir 3 mal täglich 2 Presslinge mit etwas Wasser einzunehmen.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrmenge (6 Presslinge)	Prozentsatz der Referenzmenge*
Pantothensäure (Vitamin B5)	6 mg	100 %
Vitamin E	12 mg	101 %

*nach Lebensmittel-Informationsverordnung



Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 100 Presslingen
= 39g,
PZN - 04790565

[Mehr Informationen:](#)



Presselin Calcium D+A

Mit Calcium und den Vitaminen D und A.

Calcium wird zur Erhaltung normaler Knochen benötigt.

Vitamin D trägt zum Erhalt normaler Knochen und zur normalen Aufnahme von Calcium und Phosphor bei.

Vitamin A trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei.

Zutaten:

Füllstoff Cellulose, Calciumcarbonat, Calciumlactat, Trennmittel Siliciumdioxid, Vitamin A, Emulgator Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, Vitamin D3

Verzehempfehlung:

3 mal täglich 1 Tablette.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrmenge (3 Tabletten)	Prozent der Referenzmenge*
Calcium	128 mg	16 %
Vitamin A	807 µg	101 %
Vitamin D	5 µg	100 %

*nach Lebensmittel-Informationsverordnung

Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 100 Tabletten
= 31g
PZN – 00711511

Mehr Informationen:



Presselin Magnesium Mineral

Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium und Vitamin B2.

Magnesium trägt zum Elektrolytgleichgewicht und zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Es unterstützt eine normale Muskelfunktion und eine normale Eiweißsynthese sowie die Erhaltung normaler Knochen und Zähne. Außerdem trägt Magnesium zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung und zu einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Zudem hat Magnesium eine Funktion bei der Zellteilung.

Riboflavin trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und einer normalen Funktion des Nervensystems bei. Außerdem unterstützt Riboflavin den Erhalt von roten Blutkörperchen und trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei. Darüber hinaus hilft es, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen sowie Müdigkeit und Ermüdung zu verringern.

Zutaten:

Magnesiumcitrat, Maltodextrin, Säuerungsmittel Citronensäure, Blutorangen-Aroma, Trennmittel Siliciumdioxid, Vitamin B2.

Verzehrempfehlung:

Für Ihr Wohlbefinden empfehlen wir 3 mal täglich 1 Dosierlöffel in Wasser oder Fruchtsaft gelöst zu trinken. Erfrischend fruchtig im Geschmack.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrmenge (3 Dosierlöffel = ca. 15g)	Prozent der Referenzmenge*
Vitamin B2	5,3 mg	379%
Magnesium	1163 mg	310 %

*nach Lebensmittel-Informationsverordnung



Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 175 g Pulver
PZN - 00711238



Mehr Informationen:





22 | 23

Weshalb Zink so wichtig für die Entsäuerung ist

Zink ist ein wichtiger Bestandteil einer gelungenen Entsäuerung, da es wesentlich zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei trägt.

Eine Entsäuerung soll den gesamten Körper von Schläcken und „Abfallprodukten“ befreien, und dies gelingt am besten mit einer Kombination aus Entsäuerungsprodukten in Kombination mit einer gesunden Ernährung und homöopathischer sowie pflanzlicher Umstimmung, die den Körper dazu anregen, sich selbst zu helfen.

Möchte man besonders gewissenhaft und effektiv entsäubern, kann man zunächst die Ernährung auf weitgehend basische Lebensmittel umstellen. Dazu gehört vor allem Gemüse als

Basenlieferant, aber auch basische Kräutertees liefern einen Beitrag und wirken zudem positiv auf das Wohlbefinden.

Spurenelemente sind ein wichtiger Bestandteil unserer Nahrung. Nur in ausreichenden Mengen können Sie den Körper ideal versorgen. Zink spielt eine entscheidende Rolle bei vielen Stoffwechselvorgängen: es ist an der Funktion von ca. 300 verschiedenen Enzymen beteiligt und in etwa 50 Enzymen enthalten.

Oft wird Zink zusätzlich eingenommen, um ein gesundes Wachstum von Haut und Haaren zu unterstützen. Die Funktionen von Zink im Organismus sind jedoch vielfältiger: Bei Wachstumsprozessen, der Speicherung von Insulin und der Eiweißsynthese sowie für das Immunsystem ist Zink ein essentieller Bestandteil.

Presselin Osmo

Nahrungsergänzungsmittel mit Zink und Magnesium.

Magnesium trägt zu einem normalen Energiestoffwechsel und zum Elektrolytgleichgewicht bei. Es unterstützt den Körper bei einer normalen Eiweißsynthese und bei einer normalen Muskelfunktion.

Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Knochen und Zähne bei und hat eine Funktion bei der Zellteilung.

Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel und trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Es trägt auch dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen.

Außerdem trägt Zink zu einem normalen Kohlenhydrat-Stoffwechsel, zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen, zu einem normalen Fettsäurestoffwechsel und zu einem normalen Vitamin-A-Stoffwechsel bei.

Darüber hinaus trägt Zink zu einer normalen kognitiven Funktion, zu einer normalen Eiweißsynthese, zur Erhaltung normaler Knochen, Haare, Nägel und Haut bei.

Zutaten:

Säuerungsmittel Citronensäure, Säureregulator Natriumhydrogencarbonat, Säuerungsmittel Weinsäure (L+), Magnesiumsulfat, Süßungsmittel Xylit, Zinkcitrat.

Verzehrempfehlung:

1 mal täglich 1 Dosierlöffel in einem Glas Wasser gelöst trinken.

Zusammensetzung:

	Pro Tagesverzehrmenge (1 Dosierlöffel entspricht 7g)	Prozentsatz der Referenzmenge*
Magnesium	373 mg	100 %
Zink	70 mg	700 %

*nach Lebensmittel-Informationsverordnung



Nahrungsergänzungsmittel

Dose mit 175 g Pulver
PZN – 00656172

Mehr Informationen:





„Traditionell angewendet
zur Unterstützung der
Herz-Kreislauf-Funktion.“

Presselin Weißdorn-Tropfen

Traditionelles pflanzliches Arzneimittel

Presselin Weißdorn-Tropfen wird traditionell angewendet **zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion.**
Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Zusammensetzung:

100 ml Flüssigkeit zum Einnehmen enthalten:

Wirkstoff: 59,8 g Fluidextrakt aus Weißdornblättern mit Blüten (1:1), Auszugsmittel: Ethanol 45 % (V/V).
Sonstige Bestandteile: Likörwein, Ethanol 96 % (V/V), gereinigtes Wasser, Schwefeldioxid, Glucose und Fructose.

Enthält 45 Vol.-% Alkohol.

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene 3- bis 4-mal täglich 30 Tropfen (1 ml = 32 Tropfen). Vor Gebrauch schütteln! Nehmen Sie die Tropfen mit Wasser (vorzugsweise einem Glas Wasser) ein. Nehmen Sie Presselin Weißdorn-Tropfen ohne ärztlichen Rat nicht länger als 14 Tage ein.

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Tropfflasche mit 100 ml
PZN – 07396455
Registrier-Nr. 77287.00.00

Mehr Informationen:



Auszug aus der Gebrauchsinformation „Presselin Weißdorn-Tropfen“:

1. WAS IST PRESSELIN WEIßDORN-TROPFEN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Presselin Weißdorn-Tropfen wird traditionell angewendet zur Unterstützung der Herz-Kreislauf-Funktion.

Das Arzneimittel ist ein traditionelles Arzneimittel, das ausschließlich auf Grund langjähriger Anwendung für das Anwendungsgebiet registriert ist.

Bei fortduernden Krankheitssymptomen oder beim Auftreten anderer als in der Packungsbeilage erwähnten Nebenwirkungen sollten Sie einen Arzt oder eine andere in einem Heilberuf tätige qualifizierte Person konsultieren.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PRESSELIN WEIßDORN-TROPFEN BEACHTEN?

Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise:

Presselin Weißdorn-Tropfen darf nicht eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber dem Wirkstoff Weißdornfluidextrakt, Schwefeldioxid oder einem der sonstigen Bestandteile von Presselin Weißdorn-Tropfen sind.
- wenn Sie alkoholkrank sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Presselin Weißdorn-Tropfen ist erforderlich:

Bei Auftreten von Krankheitssymptomen, insbesondere bei Ansammlung von Wasser in den Beinen, ist ein Arzt aufzusuchen. Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder in die Halsgegend ausstrahlen können, oder bei Atemnot ist eine sofortige ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

Was müssen Sie bei Einnahme von Presselin Weißdorn-Tropfen mit anderen Arzneimitteln beachten?

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln wurden bisher für Presselin Weißdorn-Tropfen nicht untersucht. Eine Verstärkung oder Abschwächung der Wirkung anderer Arzneimittel kann daher nicht ausgeschlossen werden. Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Was müssen Sie bei der Einnahme von Presselin Weißdorn-Tropfen zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken beachten?

Nehmen Sie niemals Presselin Weißdorn-Tropfen zusammen mit alkoholhaltigen Getränken ein.

Was ist bei Kindern und Jugendlichen (Heranwachsenden) zu berücksichtigen?

Zur Anwendung von Presselin Weißdorn-Tropfen bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor.

Presselin Weißdorn-Tropfen sollte deshalb bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Die Sicherheit während der Schwangerschaft und Stillzeit wurde nicht untersucht. Daher wird die Einnahme von Presselin Weißdorn-Tropfen für Schwangere und Stillende nicht empfohlen.

Eine möglicherweise vorliegende Schwangerschaft erfordert, dass Frauen, die nicht verhüten, die Einnahme von Presselin Weißdorn-Tropfen sorgfältig abwägen.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Presselin Weißdorn-Tropfen

Dieses Arzneimittel enthält Fructose. Bitte wenden Sie Presselin Weißdorn-Tropfen erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt an, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Warnhinweis

Dieses Arzneimittel enthält 45 Vol.-% Alkohol.

Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden bei jeder Einnahme pro 30 Tropfen bis zu 0,33 g Alkohol zugeführt.

Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern.

Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Hinweis: Eine Tagesdosis enthält 0,01 BE.

Weiβdorn (*Crataegus*) in der Naturheilkunde

Der Weiβdorn, lat. *Cataegus*, stellt eine wertvolle Pflanze in der Naturheilkunde dar. Verwendet werden die Blätter (lat. *Folia*), die Blüten (lat. *Flores*) und die Früchte (lat. *Fructus*) des Weiβdorns. Die Pflanze gehört zur Familie der Rosengewächsen (lat. *Rosaceae*), daher überrascht es nicht, dass die weißen Blüten die typische, rosenartige Form zeigen und die roten Früchte an Hagebutten erinnern.

Weiβdorn bietet sechs verschiedene Arten, die als Baum oder Strauch vorkommen und eine Höhe zwischen 1,5m und bis zu 4m aufweisen. Zu finden ist der Weiβdorn hauptsächlich in Mitteleuropa.

Die, für die Naturheilkunde medizinisch wirksamen Inhaltsstoffe sind Flavonoide (Hyperosid, Rutin) und Procyanide. Sie wirken gefäßdilatorisch (Gefäßerweiternd) und sorgen so für eine Steigerung des Koronardurchflusses mit zunehmendem Blutvolumen während einer Herzaktion und dadurch für eine bessere Myokarddurchblutung.

Weiβdorn wirkt chronotrop (Steigerung der Frequenz), dromotrop (Steigerung der Reizleitungsfähigkeit des Herzens), positiv inotrop (Steigerung der Kontraktionskraft) und negativ bathmotrop (Senkung der Erregbarkeit).



PROCORDAL liquid

Mischung zum Einnehmen

Anwendungsgebiete:

PROCORDAL liquid ist ein homöopathisches Herzmittel.
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören: **Beschwerden bei Herzschwäche.**

Zusammensetzung:

10 ml Mischung enthalten:		
Camphora	Dil. D1	0,1 ml
Crataegus	Ø	9,9 ml

1 ml entspricht 36 Tropfen.

Enthält 51 Vol.-% Alkohol.
Sonstige Bestandteile sind nicht enthalten.

Dosierungsanleitung:

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Bei akuten Beschwerden sollten Erwachsene halbstündlich bis stündlich, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Auszug aus der Gebrauchsinformation „PROCORDAL liquid“:

1. Was ist PROCORDAL® liquid und wofür wird es angewendet?

PROCORDAL® liquid ist ein homöopathisches Herzmittel.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: **Beschwerden bei Herzschwäche**.

Die Anwendung des Arzneimittels sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.

Bei Schmerzen in der Herzgegend, die in die Arme, den Oberbauch oder die Halsgegend ausstrahlen können, bei Ansammlung von Wasser in den Beinen oder bei Atemnot ist eine ärztliche Abklärung zwingend erforderlich.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von PROCORDAL® liquid beachten?

PROCORDAL® liquid darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe von PROCORDAL® liquid sind.
- von Alkoholkranken,
- in der Schwangerschaft,
- von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von PROCORDAL® liquid ist erforderlich

- da PROCORDAL® liquid 51 Vol.-% Alkohol enthält.

Bei Einnahme von PROCORDAL® liquid mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Auswirkungen von PROCORDAL® liquid auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind bei Einhaltung der vorgeschriebenen Dosierung bisher nicht bekannt.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann PROCORDAL® liquid Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelter von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelter von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Bei der Anwendung von PROCORDAL® liquid wurden bisher keine Nebenwirkungen beobachtet.

Hinweise:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldungen von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Flasche mit 100 ml:

PZN-00821004

Flasche mit 50 ml:

PZN-01641557

Flasche mit 20 ml:

PZN-01641540

Zulassungs-Nr.:

6312283.00.00

Mehr Informationen:



PROCORDAL vertigo

Mischung zum Einnehmen

Anwendungsgebiete:

PROCORDAL vertigo ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:
Schwindelzustände bei niedrigem Blutdruck.

Zusammensetzung:

10 ml Mischung enthalten:

Cocculus	Dil. D6	7 ml
Ipecacuanha	Dil. D6	1 ml
Petroleum rectificatum	Dil. D6	1 ml
Tabacum	Dil. D6	1 ml

1 ml entspricht 36 Tropfen. Enthält 50 Vol.-% Alkohol.

Sonstige Bestandteile sind nicht enthalten.

Dosierungsanleitung:

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Bei akuten Zuständen nehmen Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen ein. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Auszug aus der Gebrauchsinformation „PROCORDAL vertigo“:

1. Was ist PROCORDAL® vertigo und wofür wird es angewendet?

PROCORDAL® vertigo ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören: **Schwindelzustände bei niedrigem Blutdruck.**

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von PROCORDAL® vertigo beachten?

PROCORDAL® vertigo darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe von PROCORDAL® vertigo sind.
- von Alkoholkranken,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit.
- von Kindern unter 12 Jahren.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von PROCORDAL® vertigo ist erforderlich

- da PROCORDAL® vertigo 50 Vol.-% Alkohol enthält.

Bei Einnahme von PROCORDAL® vertigo mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Auswirkungen von PROCORDAL® vertigo auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind bei Einhaltung der vorgeschriebenen Dosierung bisher nicht bekannt.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann PROCORDAL® vertigo Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig: mehr als 1 Behandelter von 10

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000

Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: weniger als 1 Behandelter von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Bei der Anwendung von PROCORDAL® vertigo wurden bisher keine Nebenwirkungen beobachtet.

Hinweise:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldungen von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Flasche mit 50 ml:

PZN-01691609

Flasche mit 20 ml:

PZN-01691590

Zulassungs-Nr.:

6467347.00.00

Mehr Informationen:



Allergien ganzheitlich behandeln

Eine naturheilkundliche Allergiebehandlung beginnt bereits vor dem Flug der ersten Pollen. In der Praxis beginnen viele Heilpraktiker bereits in der kalten Jahreszeit und somit vor Blüte der „kritischen Pflanzen“ mit der Einnahme homöopathischer Präparate.

Eine Allergie ist eine Antikörperbildung, die durch körperfremde aber an sich harmlose Stoffe verursacht wird und den Körper dazu veranlasst Entzündungsprozesse auszulösen. Allergieauslösende Stoffe sind sehr vielfältig und daher oftmals schwer zu bestimmen: Hausstaubmilben, Nahrungsmittel, Blütenpollen oder auch Tierhaare können für eine Allergie verantwortlich sein.

Verschiedene Allergien wie Hausstaub-, Pollen- oder Lebensmittelallergien werden schulmedizinisch meist mit Cortison oder Antihistaminika behandelt. Auch die Desensibilisierung wird als Behandlungsmethode eingesetzt.

In der Naturheilkunde wird ein ganzheitlicher Ansatz angestrebt, der neben einer Behandlung der Symptome auch die Vorbeugung durch eine gesunde Lebensweise und die Suche nach den Ursachen der Allergie beinhaltet. Die Ernährung bei Allergie-Patienten sollte frei von künstlichen Zusatzstoffen sein, darüber hinaus sind Lebensmittel zu bevorzugen, die nicht durch Spritzmittel belastet sind. Eine gesunde Ernährung kann auch durch ein vom Heilpraktiker unterstütztes Fasten, eine basische Diät oder eine Ausleitungstherapie unterstützt werden.

Auch Störfelder, die den Körper schwächen, gilt es zu beseitigen, da diese das bereits überlastete Immunsystem weiter schwächen. Störfelder kommen häufig im Bereich der Zähne vor: dazu gehören Zahnhole, Amalgamfüllungen, abgestorbene Zähne oder Entzündungen. Auch Mandeln oder Narben können Störfelder sein. Eine Rolle spielt auch oft die Psyche: in Ausnahme- oder Stresssituationen sind manche Menschen anfälliger für Allergien.

Die Stärkung des Immunsystems ist sehr wichtig und kann zum einen durch den Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen erfolgen (orthomolekulare Medizin), aber auch durch die gezielte Anwendung von komplex-homöopathischen und pflanzlichen Präparaten. Eine weitere bewährte Behandlungsmethode der Naturheilkunde ist die Eigenbluttherapie. Diese wird evtl. mit der Ozontherapie kombiniert und erfolgt meist vorbereitend auf die Allergiesaison.

Die Stärkung der körpereigenen Abwehrkräfte kann auch durch eine Darmsanierung angeregt werden. In der Darmschleimhaut befindet sich das sogenannte „lymphoidale Gewebe“, das mehr als 70% der körpereigenen Immunzellen enthält. Die Bakterien des Darms helfen nicht nur bei der Verdauung der Nahrung sondern stärken auch die Abwehr, wenn die Darmflora sich im Gleichgewicht befindet. Bei einer Darmsanierung wird die gesunde Darmflora wieder aufgebaut.

Die Homöopathie dient bei der Behandlung allergischer Erkrankungen in erster Linie als Impuls, um die Selbstheilungskräfte des Körpers anzuregen.

Tipps für Pollenallergiker

- Ein Urlaub im Gebirge oder an der Küste ist für Pollenallergiker zu empfehlen. Die Luft im Hochgebirge über 2.000 Meter ist nahezu pollenfrei.
- Geschlossene Räume bevorzugen, Wohnungs- und Autofenster (Klimaanlage mit Pollenfilter empfehlenswert) geschlossen halten.
- Lüften Sie vor dem Schlafengehen, nicht in den Morgenstunden.
- Bevorzugen Sie das Spazieren in Laubwäldern. Die Blätter der Laubbäume filtern einen Teil der Pollen aus der Luft.
- Blumenpollen lösen in der Regel keine Heuschnupfenbeschwerden aus, da Blumen insektenbestäubte Pflanzen sind. Die Pollen werden nicht eingeaatmet. Mähen Sie Ihren Rasen oft, damit das Gras nicht blühen kann.
- Rechtzeitige ärztliche Behandlung eines Heuschnupfens beugt der Entwicklung eines allergischen Asthmas vor.
- Ernährung: Wichtig für Allergiker ist eine starke Versorgung mit den Spurenelementen Zink und Selen. Täglich benötigen Sie 10 Milligramm Zink und 50 Mikrogramm Selen. Magnesium verhindert die Abgabe von Histamin in den Blutkreislauf.

Presselin ALL Tabletten

Tabletten zum Einnehmen. Apothekenpflichtig.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören:

Allergische Erkrankungen wie Heuschnupfen und Bronchialasthma.

Die Anwendung des Arzneimittels bei Bronchialasthma sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

34|35

Zusammensetzung:

1 Tablette enthält als arzneilich wirksame Bestandteile:

Acidum arsenicosum	D6 trit.	80 mg
Acidum formicum	D3 trit.	5 mg
Aralia racemosa	D2 trit.	5 mg
Cuprum aceticum	D4 trit.	80 mg
Lobelia inflata	D4 trit.	80 mg

Gemeinsam potenziert über die letzte Stufe.

Sonstige Bestandteile: Magnesiumstearat, Maisstärke. Enthält Lactose.

Tagesterapiekosten

(Als Beispiel der aktuelle Preis von Apotal.de) 6 x täglich je eine Tablette
(Dosierung für Erwachsene)

Bei 100 Tabletten: **0,75 € pro Tag.** Die Packung reicht für ca. 16 Tage Anwendung.
Bei 200 Tabletten: **0,51 € pro Tag.** Die Packung reicht für ca. 33 Tage Anwendung.

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet, gilt für Erwachsene: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Dose mit 100 Tabletten

PZN – 00013557

Dose mit 200 Tabletten

PZN – 04129558

Zulassungs-Nr.: 54242.00.00

Mehr Informationen:



Auszug aus der Gebrauchsinformation „Presselin ALL Tabletten“:

1. WAS SIND PRESSELIN ALL-TABLETTEN UND WOFÜR WERDEN SIE ANGEWENDET?

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Allergische Erkrankungen wie Heuschnupfen und Bronchialasthma.

Die Anwendung des Arzneimittels bei Bronchialasthma sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt verordnete Arzneimittel. Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PRESSELIN ALL-TABLETTEN BEACHTEN?

Wann dürfen Sie Presselin ALL-Tabletten nicht anwenden?

Presselin ALL-Tabletten dürfen nicht angewendet werden

- bei Lactoseintoleranz,
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Aralia racemosa oder andere Pflanzen der Araliaceae-Familie (z. B. Efeu) und
- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Ameisensäure.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Presselin ALL-Tabletten mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Presselin ALL-Tabletten zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Presselin ALL-Tabletten haben keinen oder nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Presselin ALL-Tabletten ist erforderlich

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Presselin ALL-Tabletten:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose. Bitte nehmen Sie Presselin ALL-Tabletten daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel können auch Presselin ALL-Tabletten Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

TUSSISANA

Mischung zum Einnehmen

Anwendungsgebiete:

TUSSISANA ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.
Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören: **Bronchitis, Keuchhusten.**

36 | 37

Zusammensetzung:

10 ml Mischung enthalten:

Drosera	Dil. D2	9,75 ml
Ipecacuanha	Dil. D4	0,25 ml


1 ml entspricht 36 Tropfen.

Enthält 51 Vol.-% Alkohol.

Sonstige Bestandteile sind nicht enthalten.

Dosierungsanleitung:

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12-mal täglich, je 5-10 Tropfen einnehmen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5-10 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.



Flasche mit 50 ml:

PZN-00604873

Flasche mit 20 ml:

PZN-00604867

Zulassungs-Nr.:

6312395.00.00

[Mehr Informationen:](#)



Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Auszug aus der Gebrauchsinformation „TUSSISANA“:

1. Was ist TUSSISANA® und wofür wird es angewendet?

TUSSISANA® ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimitteldbildern ab.

Dazu gehören: **Bronchitis, Keuchhusten**.

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von TUSSISANA® beachten?

TUSSISANA® darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe von TUSSISANA® sind.
- von Alkoholkranken.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von TUSSISANA® ist erforderlich

- da TUSSISANA® 51 Vol.-% Alkohol enthält.
- bei Kindern unter 12 Jahren, da hier zur Anwendung dieses Arzneimittels keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen. Es soll deshalb von Kindern unter 12 Jahren nicht eingenommen werden.

Bei Einnahme von TUSSISANA® mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis:

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in der Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach Rücksprache mit dem Arzt eingenommen werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Auswirkungen von TUSSISANA® auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind bei Einhaltung der vorgeschriebenen Dosierung bisher nicht bekannt.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann TUSSISANA® Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	<i>mehr als 1 Behandelter von 10</i>
Häufig:	<i>1 bis 10 Behandelte von 100</i>
Gelegentlich:	<i>1 bis 10 Behandelte von 1.000</i>
Selten:	<i>1 bis 10 Behandelte von 10.000</i>
Sehr selten:	<i>weniger als 1 Behandelter von 10.000</i>
Nicht bekannt:	<i>Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar</i>

Bei der Anwendung von TUSSISANA® wurden bisher keine Nebenwirkungen beobachtet.

Hinweise:

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung).

In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldungen von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker oder das medizinische Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundes-institut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Just
breathe.



Lomabronchin NF

Mischung zum Einnehmen. Tropfen. Apothekenpflichtig

Ab
dem 1.
Lebensjahr

Anwendungsgebiete:

Lomabronchin NF ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören: **Besserung der Beschwerden bei Infekten der oberen Atemwege.**

Zusammensetzung:

10 g [entsprechend 10,88 ml] der Mischung enthalten die Wirkstoffe:

Drosera	Dil. D 4	3,369 g
Cephalis Ipecacuanha	Dil. D 6	1,071 g
Rumex crispus	Dil. D 4	1,122 g
Eriodictyon californicum	Dil. D 4	2,234 g
Echinacea	Urtinktur	2,204 g

1 ml der Mischung entspricht 34 Tropfen.

Dieses Arzneimittel enthält 58 Vol.-% Alkohol.

Dosierungsanleitung:

Dosierung bei akuten Zuständen. Alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6 mal täglich: Kleinkinder ab 1 Jahr: je 2-3 Tropfen; Kinder von 6 bis 12 Jahren: je 3-4 Tropfen; Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: je 5 Tropfen. Das genaue Dosierungsschema entnehmen Sie bitte der Gebrauchsinformation.

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation „Lomabronchin NF“:

1. Was ist Lomabronchin NF und wofür wird es angewendet?

Lomabronchin NF ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen der Atemorgane. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei Infekten der oberen Atemwege.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Lomabronchin NF beachten?

Lomabronchin NF darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe von Lomabronchin NF sind.
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Korbblüter sind.

Aus grundsätzlichen Erwägungen darf Lomabronchin NF nicht eingenommen werden bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. leukämieähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankungen, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Lomabronchin NF ist erforderlich

Lomabronchin NF darf nicht bei Kindern unter 1 Jahr angewendet werden.

Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Bei Einnahme von Lomabronchin NF mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen von Lomabronchin NF mit anderen Arzneimitteln wurden bisher nicht beobachtet.

Bei Einnahme von Lomabronchin NF zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Lomabronchin NF in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Ein Einfluss von Lomabronchin NF auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wurde bisher nicht beobachtet.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Lomabronchin NF

Dieses Arzneimittel enthält 58 Vol.-% Alkohol.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Lomabronchin NF Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Sehr selten können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen. Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldungen von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder medizinisches Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Flasche mit 50 ml
PZN – 04676295
Zulassungs-Nr.:
6538745.00.00

Mehr Informationen:



*Just be
yourself.*



Poikiven

Mischung zum Einnehmen. Tropfen. Apothekenpflichtig

Anwendungsgebiete:

Poikiven ist ein homöopathisches Arzneimittel bei **Erkrankungen des Gefäßsystems**. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: **Beschwerden bei Krampfaderleiden**.

Zusammensetzung:

10 g [entsprechend 10,87 ml] der Mischung enthalten die Wirkstoffe:

Aesculus hippocastanum	Dil. D1	2,429 g
Arnica montana	Ø	0,454 g
Silybum marianum	Dil. D1	1,008 g
Hamamelis virginiana	Dil. D1	1,939 g
Lachesis mutus	Dil. D6	1,334 g
Lycopodium clavatum	Dil. D4	0,901 g
Melilotus officinalis	Dil. D3	1,935 g

1 ml der Mischung entspricht 34 Tropfen.

Dieses Arzneimittel enthält 60 Vol.-% Alkohol.

Dosierungsanleitung:

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre nehmen 1-3 mal täglich je 5 Tropfen Poikiven ein. Bei plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bei bläulicher Verfärbung der Beine ist eine sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert. Weitere vom Arzt verordnete nicht invasive Maßnahmen, wie z. B. Wickeln der Beine, Tragen von Stützstrümpfen oder kalte Wassergüsse, sollten unbedingt eingehalten werden.

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Auszug aus der Gebrauchsinformation „Poikiven“:

1. Was ist Poikiven und wofür wird es angewendet?

Poikiven ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Gefäßsystems. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Beschwerden bei Krampfaderleiden.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Poikiven beachten?

Poikiven darf nicht eingenommen werden

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen die Wirkstoffe von Poikiven sind.
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Korblüter sind.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Poikiven ist erforderlich

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern unter 12 Jahren liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei plötzlich verstärkt auftretenden Schmerzen, schnell zunehmender Schwellung oder bei bläulicher Verfärbung der Beine ist eine sofortige Rücksprache mit dem Arzt erforderlich, da diese Merkmale Anzeichen einer Beinvenenthrombose sein können, die rasches ärztliches Eingreifen erfordert.

Weitere vom Arzt verordnete nicht invasive Maßnahmen, wie z. B. Wickeln der Beine, Tragen von Stützstrümpfen oder kalte Wasserergüsse, sollten unbedingt eingehalten werden.

Bei Einnahme von Poikiven mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen von Poikiven mit anderen Arzneimitteln wurden bisher nicht beobachtet.

Bei Einnahme von Poikiven zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Poikiven in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Ein Einfluss von Poikiven auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen wurde bisher nicht beobachtet.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Poikiven

Dieses Arzneimittel enthält 60 Vol.-% Alkohol.

Hinweis

Zumindest zu Beginn der Therapie von Krampfaderleiden sollte an die zusätzliche Verwendung von Kompressionsverbänden bzw. Stützstrümpfen gedacht werden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Poikiven Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig:	kann bis zu 1 von 10 Behandelten betreffen
Gelegentlich:	kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
Selten:	kann bis zu 1 von 1000 Behandelten betreffen
Sehr selten:	kann bis zu 1 von 10000 Behandelten betreffen
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Mögliche Nebenwirkungen

Gelegentlich können Völlegefühl und Übelkeit auftreten, wenn die Einnahme vor den Mahlzeiten erfolgt.

Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldungen von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt, Apotheker oder medizinisches Fachpersonal. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Flasche mit 50 ml
PZN – 04879503
Zulassungs-Nr.:
6538509.00.00

Mehr Informationen:





Presselin Nervenkomplex

Tabletten zum Einnehmen. Apothekenpflichtig.

Anwendungsgebiete:

Besserung der Beschwerden bei **nervöser Erschöpfung**

Zusammensetzung:

1 Tablette 250 mg enthält als arzneilich wirksame Bestandteile:

Acidum phosphoricum	Trit. D3	0,600 mg
Acidum picrinicum	Trit. D4	13,000 mg
Ambra grisea	Trit. D2	20,000 mg
Zincum aceticum	Trit. D4	13,000 mg
Zincum phosphoricum	Trit. D4	13,000 mg
Zincum isovalerianicum	Trit. D4	13,000 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: Magnesiumstearat, Maisstärke, Lactose-Monohydrat

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchsten 6 mal täglich, je 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1-3 mal täglich 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahmen zu reduzieren.

- ✓ Enthält Acidum phosphoricum als Energieträger
- ✓ Mit 3 Zinkverbindungen:
 - Zincum aceticum (Zinkacetat-Dihydrat)
 - Zincum phosphoricum (Zinkphosphat)
 - Zincum isovalerianicum (Zinkisovalerianat)
- ✓ Traditionelle Zusammensetzung der Firma Presselin
- ✓ Enthält den homöopathischen Stoff Ambra grisea

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Auszug aus der Gebrauchsinformation „Presselin Nervenkomplex“:

1. Was ist Presselin Nervenkomplex und wofür wird es angewendet?

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.
Dazu gehören: Besserung der Beschwerden bei nervöser Erschöpfung.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Presselin Nervenkomplex beachten?

Presselin Nervenkomplex darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegenüber einem der in der Zusammensetzung genannten Wirkstoffe oder sonstigen Bestandteile des Arzneimittels sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Presselin Nervenkomplex einnehmen.

Bei länger anhaltenden Erschöpfungszuständen, bei Gewichtsabnahme sowie bei allen anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Presselin Nervenkomplex zusammen mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Einnahme von Presselin Nervenkomplex zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen, sollte Presselin Nervenkomplex in Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Presselin Nervenkomplex hat keinen oder nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Presselin Nervenkomplex enthält Lactose

Bitte nehmen Sie Presselin Nervenkomplex daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt oder homöopathisch erfahrenen Therapeuten befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Webseite: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Dose mit 100 Tabletten

PZN - 06679636

Dose mit 200 Tabletten

PZN - 06679659

Zul.-Nr.: 6773191.00.00

Mehr Informationen:



Presselin Osteo N

Mischung zum Einnehmen / Tropfen. Apothekenpflichtig.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: **Besserung von Gelenkbeschwerden.**

Zusammensetzung:

10 g (10 g entsprechen ca. 10,3 ml) zum Einnehmen enthalten arzneilich wirksame Bestandteile:

Aesculus	Dil. D1	0,68 mg
Calcium carbonicum Hahnemann	Dil. D8	400,00 mg
Calcium carbonicum Hahnemann	Dil. D12	0,68 mg
Calcium phosphoricum	Dil. D8	400,00 mg
Calcium phosphoricum	Dil. D12	0,68 mg
Cobaltum metallicum	Dil. D8	60,00 mg
Rhus toxicodendron	Dil. D4	68,00 mg
Silicea	Dil. D8	68,00 mg
Silicea	Dil. D12	0,68 mg
Symphytum (HAB 1934)	Dil. D12	(HAB, Vorschrift 3a) 0,68 mg
Symphytum (HAB 1934)	Dil. D20	(HAB, Vorschrift 3a) 0,68 mg

Sonstige Bestandteile:

Ethanol 94 % (m/m), gereinigtes Wasser.

Enthält 25 Vol.-% Alkohol.

Dosierungsanleitung:

Soweit nicht anders verordnet: Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

44 | 45



Tropfflasche mit 100 ml
PZN – 06679613
Zulassungsnummer:
6773363.00.00

Mehr Informationen:



Auszug aus der Gebrauchsinformation „Presselin Osteo N“:

1. WAS IST PRESSELIN OSTEO N UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Presselin Osteo N ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Bewegungsapparats.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Besserung von Gelenkbeschwerden.

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER EINNAHME VON PRESSELIN OSTEO N BEACHTEN?

Wann dürfen Sie Presselin Osteo N nicht anwenden?

Presselin Osteo N darf nicht angewendet werden, wenn Sie überempfindlich gegen Giftsumachgewächse sind.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bei akuten Zuständen, die z. B. mit Rötung, Schwellung oder Überwärmung von Gelenken einhergehen sowie andauernden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder und Jugendliche

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Bei Einnahme von Osteo N mit anderen Arzneimitteln

Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Einnahme von Osteo N zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, sollte das Arzneimittel nur nach

Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Presselin Osteo N hat keinen oder nur einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Presselin Osteo N

Dieses Arzneimittel enthält 25 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosieranleitung werden bei jeder Einnahme pro 5 Tropfen bis zu 0,04 g Alkohol zugeführt. Ein gesundheitliches Risiko besteht u.a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren, Stillenden und Kindern. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Presselin Osteo N Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Es sind keine Nebenwirkungen bekannt.

Hinweis: Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu befragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Pressl Alte Rezeptur

Aromatisierter Wein mit Ginseng-Geschmack

Zusammensetzung:

Likörwein, gereinigtes Wasser, Ethanol, **Sulphite**,

Aromen von: Weissdornblätter mit Blüten, Ginsengwurzel, Kamillenblüten, Kardamom, Kümmel, Lakritzestangen, Lavendelblüten, Wermutkraut. Enthält Süßholz.

alc. 18% vol.

Ursprünglich kam dieser Wein als **Herzwein** auf den Markt.

Im Jahre 2003 musste er umbenannt werden, da der Wortteil „Herz“ eine organbezogene Aussage beinhaltet. Aus dem Herzwein wurde der Vitalwein.

Nach EU-Weinrecht wurde die Flaschengröße von 700 ml auf 750ml vereinheitlicht. Der Zusatz „aromatisierter Wein“ muss gesetzlich deklariert werden.

Er enthält keine künstlichen Aromastoffe.

Im Likörwein entfalten die zerkleinerten Pflanzenteile als Extrakte nach einer Standzeit von ca. 3 Monaten ihre Kraft.

Die enthaltenen Kräuter geben Pressl Alte Rezeptur seinen besonderen Geschmack.

Der Name „Pressl“ erinnert an den Firmengründer (Hans Preßl), der diesen Wein bereits vor Jahrzehnten produzierte.

Mehr Informationen:

750ml
PZN-09012996



Bestellung

Tel. / E-Mail

1 Flasche	15,90 Euro
Ab 6 Flaschen	12,50 Euro
Ab 12 Flaschen	11,50 Euro
Ab 18 Flaschen	9,90 Euro

Bitte beachten Sie:

1 Versandkarton = 6 Flaschen

Anzahl Hiermit bestelle ich:

Pressl Alte Rezeptur, 750 ml Preis

GUTSCHEIN über 10,-€
Einlösbar ab einem Bestellwert von 50,-€
Nur ein Gutschein je Haushalt

Gesamtsumme:

Wir liefern portofrei ab einem Bestellwert von 20,- €



Ratschläge für Akne-Patienten

Akne ist eine Erkrankung der Talgdrüsen. Die Therapie verlangt Geduld und Ihre gewissenhafte Mitarbeit!

Medizinisch gesehen sind hauptsächlich vier Ursachen für die Entstehung einer Akne verantwortlich. Zunächst muss eine Veranlagung des einzelnen für diese Krankheit vorhanden sein.

Die Akne entsteht dann dadurch, dass in den Talgdrüsen der Haut eine überhöhte Talgproduktion stattfindet. Gleichzeitig kommt es zu einer Verhornung und infolge davon zu einer Verstopfung der Talgdrüsenausgänge. Dieser Hornpfropf wird im Laufe der Zeit nach außen gedrückt und dann auf der Hautoberfläche als Pickel sichtbar. Gleichzeitig findet bei der Akne in den Talgdrüsen eine krankhafte Vermehrung von Aknebakterien statt. Diese Bakterien führen dazu, dass sich das Innere der befallenen Talgdrüsen entzündet und Eiter bildet. Diätfehler, Unsauberkeit oder mangelnde Bewegung sind also grundsätzlich nicht für die Entstehung einer Akne verantwortlich zu machen.

Akne beruht auf einer Störung der Talgdrüsensfunktion der Haut!

Hinweis: Arzneimittel erfüllen Ihre Aufgabe nur dann in vollem Umfang, wenn sie regelmäßig und sorgfältig nach den Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers angewendet werden.

Nicht an den Pickeln herumdrücken: Vermeiden Sie unbedingt ständiges Drücken und Quetschen an den Pickeln. Dies kann dazu führen, dass sich die Entzündung der Talgdrüsen verstärkt und sich die Akne verschlimmert. Außerdem können dadurch hässliche Narben zurückbleiben.

Sachgerechte Hautreinigung: Häufiges Waschen hilft nicht weiter; reinigen Sie Ihre Aknehaut zweimal täglich richtig - nicht öfter! Geeignet hierfür sind alkalifreie Reinigungsmittel (Syndets), die ihre Haut schonend entfetten und zudem den natürlichen Säureschutzmantel der Haut erhalten. Reinigungsmasken sind geeignet, Pickel aufzuweichen und die Aknehaut für eine kosmetische Behandlung vorzubereiten.

Sonne und Höhensonnen: Bei starker Sonneneinstrahlung sind Sonnenschutzmittel anzuraten. Geeignet hierfür sind ausschließlich fettarme oder besser fettfreie Lotionen, Gels oder Lösungen. Dauer und Häufigkeit von Solarien-Anwendungen sollten Sie in jedem Fall mit Ihrem Hautarzt absprechen.

Kosmetik: Grundsätzlich ist pflegende oder abdeckende Kosmetik bei Akne nicht verboten.

Geeignet hierfür sind am besten Präparate, die wenig oder kein Fett enthalten, wie z.B. Cremes oder Lotionen. Auch Puder sind geeignet, weil sie fettaufsaugend und austrocknend wirken.

Wichtig ist hierbei, dass die Haut abends gründlich gereinigt und das Make-up vor der Arzneimittelanwendung restlos entfernt wird.

Nahrung und Diät: Entgegen früherer Meinung haben diätetische Maßnahmen im allgemeinen keinen Einfluss auf das Krankheitsgeschehen der Akne. Eine leicht verdauliche, ballaststoff- und vitaminreiche Ernährung fördert aber die Stoffwechselvorgänge und das Allgemeinbefinden. Das unterstützt die Behandlung der Akne.



B.P.O. Combustin Gel 5%

B.P.O. Combustin Gel ist ein äußerlich anzuwendendes Arzneimittel gegen alle Formen der Akne (Akne Vulgaris).

Zusammensetzung:

100 g farbloses Gel enthalten: 5 g Benzoylperoxid. Sonstige Bestandteile:
Propylenglykol, alpha-Dodecyl-omega-hydroxypoly-(oxyethylen)-23, Carbomer,
Natriumhydroxid, Stearylisononanoat, gereinigtes Wasser.



Dosierungsanleitung:

Falls nicht anders verordnet: Das Gel wird 1-2mal täglich angewendet. Bei empfindlicher Haut kann B.P.O. Combustin Gel zu Behandlungsbeginn 1mal täglich abends angewendet werden. Das Gel wird nach vorheriger Reinigung der Haut dünn auf die befallenen Stellen aufgetragen. Die Behandlungsdauer beträgt etwa 4 - 10 Wochen.

Gegenanzeigen:

Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Benzoylperoxid oder einen der verwendeten Hilfsstoffe wie beispielsweise Propylenglykol ist von der Anwendung des Präparates abzusehen. Während einer Therapie mit Benzoylperoxid sollte eine gleichzeitige intensive UV-Bestrahlung (z.B. in Form von Sonnenbädern oder Solarien) der behandelten Fläche vermieden werden. Das Gel darf nicht mit Augen und Schleimhäuten in Berührung gebracht werden. B.P.O. Combustin Gel sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach sorgfältiger Beratung durch den Arzt angewendet werden. Erkenntnisse über den Übergang in die Muttermilch nach externer Behandlung in der Stillzeit liegen nicht vor.

Nebenwirkungen:

In seltenen Fällen kann Benzoylperoxid durch den Kontakt mit der Haut zu Überempfindlichkeitsreaktionen (Kontaktaллерgische Sensibilisierung) führen. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandteile, wie beispielsweise Propylenglykol, sind allergische Reaktionen möglich. Zu Beginn der Behandlung mit B.P.O. Combustin Gel kann es durch das Einsetzen der Wirkung zu leichten Hautreizungen wie Rötung, Juckreiz, Spannungsgefühl und Brennen kommen. Diese Erscheinungen klingen normalerweise nach einigen Tagen ab.

Hinweise:

Wegen der Bleichwirkung des Wirkstoffs Benzoylperoxid soll B.P.O. Combustin Gel nicht an den Augenbrauen, im Barbereich oder am Haarsatz angewendet werden. Das gilt auch für farbige Textilien, da diese gebleicht oder farblich verändert werden können. Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchsinformation!.

Tube mit 50 g (PZN - 07705525)
Tube mit 100 g (PZN - 07705531)

Zulassungs-Nr. 23810.00.00
Apothekenpflichtig.

Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.



Gebrauchsinformation „B.P.O. Combustin Gel“:

1. WAS IST B.P.O. Combustin Gel UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

B.P.O. Combustin Gel ist ein äußerlich anzuwendendes Arzneimittel gegen alle Formen der Akne (Akne Vulgaris).

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON B.P.O. Combustin Gel BEACHTEN?

Hinweis:

Wegen der Bleichwirkung des Wirkstoffs Benzoylperoxid soll B.P.O. Combustin Gel nicht an den Augenbrauen, im Bartbereich oder am Haarsatz angewendet werden. Das gilt auch für farbige Textilien, da diese gebleicht oder farblich verändert werden können.

B.P.O. Combustin Gel darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen den Wirkstoff Benzoylperoxid oder einen der sonstigen Bestandteile von B.P.O. Combustin Gel sind.

50|51

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von B.P.O. Combustin Gel ist erforderlich

- Das Gel darf nicht mit den Augen oder mit Schleimhäuten (z. B. in Mund und Nase) in Berührung kommen.
- Während einer Behandlung mit B.P.O. Combustin Gel sollten Sie eine gleichzeitige intensive UV-Bestrahlung (z. B. Sonnenbäder oder Solarien) der behandelten Hautflächen vermeiden.

Bei Anwendung von B.P.O. Combustin Gel mit anderen Arzneimitteln

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln sind nicht bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

B.P.O. Combustin Gel sollte in der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach sorgfältiger Beratung durch den Arzt angewendet werden.

Erkenntnisse über den Übergang in die Muttermilch nach externer Behandlung in der Stillzeit liegen nicht vor.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von B.P.O. Combustin Gel

Propylenglykol kann Hautreizungen hervorrufen.

3. WIE IST B.P.O. Combustin Gel ANZUWENDEN?

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt B.P.O. Combustin Gel nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da B.P.O. Combustin Gel sonst nicht richtig wirken kann.

Wieviel von B.P.O. Combustin Gel und wie oft sollten Sie B.P.O. Combustin Gel anwenden?

Das Gel wird 1- bis 2-mal täglich angewendet. Bei empfindlicher Haut kann B.P.O. Combustin Gel zu Behandlungsbeginn 1-mal täglich abends angewendet werden.

Wie und wann sollten Sie B.P.O. Combustin Gel anwenden?

Tragen Sie das Gel nach vorheriger Reinigung der Haut dünn auf die befallenen Stellen auf.

Wie lange sollten Sie B.P.O. Combustin Gel anwenden?

Wenden Sie B.P.O. Combustin Gel so lange an, bis sich die Akneerkrankung gebessert hat oder die Hauterscheinungen abgeklungen sind. Die Behandlungsdauer beträgt etwa 4 bis 10 Wochen.

Wenn Sie die Behandlung mit B.P.O. Combustin Gel abbrechen

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie die Anwendung von B.P.O. Combustin Gel beenden möchten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann B.P.O. Combustin Gel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr Häufig: mehr als 1 Behandelter von 10

Häufig: 1 bis 10 Behandelte von 100

Gelegentlich: 1 bis 10 Behandelte von 1.000

Selten: 1 bis 10 Behandelte von 10.000

Sehr selten: weniger als 1 Behandelter von 10.000

Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

In seltenen Fällen kann Benzoylperoxid durch den Kontakt mit der Haut zu Überempfindlichkeitsreaktionen (kontakt-allergische Sensibilisierung) führen. Bei Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandteile, wie beispielsweise Propylenglykol, sind allergische Reaktionen möglich. Zu Beginn der Behandlung mit B.P.O. Combustin Gel kann es durch das Einsetzen der Wirkung zu leichten Hautreizungen wie Rötung, Juckreiz, Spannungsgefühl und Brennen kommen. Diese Erscheinungen klingen normalerweise nach einigen Tagen ab.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Austrocknen und mäßiges Schälen der Haut gehören zu den erwünschten Wirkungen von B.P.O. Combustin Gel. Wenn diese Anzeichen länger als 5 Tage anhalten oder sich verstärken, sollten Sie B.P.O. Combustin Gel absetzen und Ihren Arzt um Rat fragen.

Das gleiche gilt, wenn Sie auf B.P.O. Combustin Gel allergisch reagieren.

Notfallmaßnahmen

Ein versehentlicher Kontakt mit den Augen führt zu Rötungen und Brennen. Spülen Sie das betroffene Auge ca. 15 Minuten lang mit fließendem Wasser.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST B.P.O. Combustin Gel AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Bitte bewahren Sie B.P.O. Combustin Gel nicht über 25°C auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Tube und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Wir schenken Ihnen
10,-€

ab einem Bestellwert von 50,-€



Bestellung

Name / Vorname

Straße / PLZ / Ort

Tel. / E-Mail

<input type="checkbox"/> Presselin Adsella Energie	100 Presslinge	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Artkomplex	100 Presslinge	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Auszeit	100 Presslinge	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Erholsame Nacht	200 ml	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Peptikum	200 ml	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Lebensfreude	100 Presslinge	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Magda	100 Presslinge	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Meta	100 Presslinge	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Niebla	100 Presslinge	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Paticum	100 Presslinge	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Calcium D+A	100 Tabletten	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Magnesium Mineral	175 g Pulver	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Osmo	175 g Pulver	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Presselin Weißdorn-Tropfen	100 ml	<input type="text"/>

GUTSCHEIN

über 10,-€

Einlösbar ab einem Bestellwert von 50,-€
Nur ein Gutschein je Haushalt

Gesamtsumme:

Wir liefern portofrei ab einem Bestellwert von 20,- €

Jedes Alter hat seine Sorgen

Viele **FRAUEN** "kämpfen" mit: Schlafstörungen, Alltägliche Mehrfach-Belastung (Haushalt, Beruf, Kinder), Erschöpfung, Hormonell bedingte Verstimmungen, wechselnde Befindlichkeit während des Zyklus, Psychosomatische Beschwerden (wie Kopfschmerzen), Ängste, Schwitzen ...

JUGENDLICHE ab 12 Jahren quälen sich häufig mit: Erfolgsdruck, Prüfungsstress und Prüfungsangst, Unruhezuständen, Schlafstörungen, Schulstress, Pubertät, Konzentrationsstörung ...

MÄNNER haben oftmals Sorgen mit: Stress im Beruf, Erfolgsdruck, Schlafstörungen, Alltägliche Belastungen, Psychosomatische Beschwerden (wie Herzrasen), Innere Unruhe, Schulden und finanzielle Sorgen ...



COMBUSTIN
Pharmazeutische Präparate GmbH
Offinger Straße 7
88525 Hailtingen

Tel. 0 73 71/ 96 53 56
Fax 0 73 71/ 96 53 58
E-Mail: office@presselin.de
www.presselin.de